

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
FERTOMCIDINA "U" 17,5 mg/ml + 30,00 mg/ml soluzione cutanea
acido salicilico/ sodio Ioduro

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è FERTOMCIDINA "U" e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FERTOMCIDINA "U"
3. Come usare FERTOMCIDINA "U"
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FERTOMCIDINA "U"
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è FERTOMCIDINA "U" e a cosa serve

FERTOMCIDINA "U" è una soluzione acquosa salso-bromoiodica usata per la disinfezione e la pulizia della pelle in caso di ferite superficiali di piccole dimensioni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare FERTOMCIDINA "U"

Non usi FERTOMCIDINA "U"

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se soffre di problemi alla tiroide
- in caso di gravidanza e allattamento con latte materno

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FERTOMCIDINA "U".

- Non usi il prodotto per trattamenti prolungati: dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili è necessario consultare il medico. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico (locale) può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reazione dell'organismo a sostanze estranee con cui è venuto in contatto). In tal caso **interrompa il trattamento** e consulti il medico per iniziare una terapia adatta.
- Il prodotto è solo per uso esterno.

- Non applichi un bendaggio perché non permette la traspirazione della parte trattata.
- Eviti l'impiego su superfici estese e il contatto con gli occhi.
- L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta mortali. **In caso di ingestione accidentale consulti immediatamente un medico.**

Il prodotto può lasciare sugli indumenti macchie che possono essere eliminate con acqua; evitare l'uso di sapone.

Altri medicinali e FERTOMCIDINA "U"

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Evitare l'uso contemporaneo con qualsiasi altro prodotto ed in particolare pomate o gel.

Non usare sotto guttaperca o altre sostanze impermeabili.

Non applicare sulla parte trattata contemporaneamente sali di mercurio o composti di benzoio.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

FERTOMCIDINA "U" non deve essere usato in gravidanza e durante l'allattamento con latte materno. Lo iodio contenuto in FERTOMCIDINA "U" può essere assorbito, attraversare la placenta e passare nel latte.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

FERTOMCIDINA "U" non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come usare FERTOMCIDINA "U"

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico, o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi una piccola quantità di prodotto sulla parte lesa, tramite tocature, impacchi o lavaggi.

Se necessario, ripeta l'operazione 2-3 volte al giorno.

Non superi il numero di applicazioni giornaliere consigliate.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi di bruciore o irritazione (intolleranza).

La reazione dello iodio con i tessuti lesi può ritardarne la cicatrizzazione. L'applicazione su ustioni o abrasioni di vasta superficie può produrre assorbimento dello iodio nel sangue: in questi casi si consiglia il controllo della funzionalità della tiroide.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FERTOMCIDINA "U"

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Tenere il flacone ben chiuso, protetto dalla luce e lontano da fonti di calore.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FERTOMCIDINA "U"

- I principi attivi contenuti in 100 ml di soluzione cutanea sono:
Acido salicilico 1,75 g; Sodio ioduro 3 g
- Gli altri componenti sono: Bromuro di Ammonio; Fosfato di Magnesio bibasico; Acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FERTOMCIDINA U e contenuto della confezione

Soluzione cutanea in flaconi di polietilene da 100 ml, da 200 ml e da 1000 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Theriaca S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II, 10 - Pescara (PE), Italia **Produttore e controllore finale**

New.Fa.Dem. S.r.l.

Via Ferrovia dello Stato - 80014 Giugliano (NA)

ITC Farma S.r.l.

Via Pontina 5 km 29 - 00071 Pomezia (RM)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 03/2021